



REGISTRO TUMORI ASL CASERTA

RAPPORTO 2016



ESTRATTO

PERIODO DI ANALISI 2008-2010

A CURA DI: A. D'ARGENZIO, M. D'ABRONZO, D. DE FRANCESCO M.C. MENDES PEREIRA DA SILVA, V. MENDITTO, M.T. PESCE, E. PERROTTA, A. SESSA

SCHEDE SPECIFICHE PER TUMORE



Dati analitici del tumore

Distribuzione per età alla diagnosi

Distribuzione per tipo di tumore / morfologia

Tassi standardizzati per distretto sanitario

Confronto incidenza e mortalità con macro-aree italiane e media nazionale

TABELLA CON I DATI ANALITICI DEL TUMORE

Tasso standardizzato
da utilizzarsi sempre per i confronti perché "aggiustato" per l'effetto di invecchiamento della popolazione

Rischio cumulativo 0-74
esprime in modo approssimativo la percentuale di rischio per un soggetto di contrarre la malattia nel corso della vita

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	98	67	165	80	56	136
Numeri casi totali	293	201	494	241	168	409
% casi sul totale	4.4	3.8	4.1	6.6	7	6.7
Tasso grezzo ⁽¹⁾	22.5	14.6	18.5	18.5	12.2	15.3
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	19.8	10.7	14.8	16.3	8.3	11.8
Rischio cum. 0-74 (%)	1.5	0.8	1.1	1.2	0.5	0.9
Rapporto M/I (%)	82.3	83.6	82.8			
VM (%)	93.2	87.1	90.7			
DCO (%)	2	2	2			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso


TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO SANITARIO

Tasso significativamente inferiore alla media provinciale

Quando gli intervalli di confidenza del distretto (linea nera) sono a sinistra e non toccano gli intervalli di confidenza del tasso medio provinciale (banda arancione)

Tasso medio provinciale

la larghezza della banda indica la variabilità del dato (intervalli di confidenza)



Tasso significativamente superiore alla media provinciale

Quando gli intervalli di confidenza del distretto (linea nera) sono a destra e non toccano gli intervalli di confidenza del tasso medio provinciale (banda arancione)


CONFRONTI DEL TASSO STANDARDIZZATO CON MACRO-AREE ITALIANE

Tasso significativamente inferiore all'area di confronto

Quando gli intervalli di confidenza di Caserta (linea orizzontale) sono a sinistra e non toccano il valore atteso (riga nera verticale)

Dato di incidenza
colore arancione

Dato di mortalità
colore viola



Tasso non differente dall'area di confronto

Quando gli intervalli di confidenza di Caserta (linea orizzontale) incrociano il valore atteso (riga nera verticale)

Tasso significativamente superiore all'area di confronto

Quando gli intervalli di confidenza di Caserta (linea orizzontale) sono a destra e non toccano il valore atteso (riga nera verticale)

SINTESI DEI DATI

Il Registro Tumori dell'A.S.L. Caserta è un registro di popolazione generale che copre tutti i 104 Comuni della Provincia di Caserta, per un totale di 924.614 abitanti¹.

Di seguito una sintesi dei primi dati inerenti il triennio 2008-2010.

Incidenza

In provincia di Caserta, dal 2008-2010, sono stati diagnosticati 11.940 nuovi casi di tumore maligno², 6.685 (56%) tra i maschi e 5.255 (44%) tra le femmine.

I cinque tumori più frequentemente diagnosticati sono stati:

- il cancro del polmone (17,7%), della vescica (14,6%), della prostata (14%), del colon-retto (11,4%) e del fegato (5,7%) tra gli uomini;
- il cancro della mammella (27,2%), del colon-retto (12,3%), dell'utero (7,4%), i linfomi (5,0%) e il cancro della tiroide (4,7%) tra le donne.

Il tasso di incidenza per tutti i tumori, standardizzato sulla popolazione europea, è pari a 378,8 per 100.000 residenti, rispettivamente 464,8 nei maschi e 314,8 nelle femmine.

I tassi di incidenza standardizzati, divisi per sesso, risultano inferiori rispetto a quelli dell'Italia e, in modo statisticamente significativo, rispetto a quelli del Nord³, mentre risultano significativamente superiori rispetto al Sud³.

La distribuzione per età evidenzia una maggior incidenza della patologia oncologica nelle fasce più avanzate, così come atteso, trattandosi di malattie cronico-degenerative, mentre i tumori infantili e adolescenziali (0-19 anni) rappresentano, fortunatamente, una quota estremamente esigua del totale (1,1%).

Mortalità

I deceduti per tumore⁴ nel triennio 2008-2010 sono stati 6.071, 3.660 (60,3%) maschi e 2.411 (39,7%) femmine, su un totale di 21.886 decessi per tutte le cause.

Le più frequenti cause di morte tumorale sono state:

- il cancro del polmone (30,2%), del colon-retto (8,4%), della prostata (8,1%), del fegato (7,9%) e dello stomaco (6,6%) tra gli uomini;
- il cancro della mammella (17,2%), del colon-retto (13,1%), del polmone (8,4%), dello stomaco (7%) e del fegato (7,1%) tra le donne.

Il tasso di mortalità, standardizzato sulla popolazione europea, è pari a 178,2 per 100.000 residenti, rispettivamente 250,2 nei maschi e 124,6 nelle femmine.

I tassi di mortalità standardizzati, per i maschi, risultano

superiori, in maniera statisticamente significativa, se confrontati con quelli dell'Italia³, del Sud³, del Centro e del Nord, mentre per le femmine risultano significativamente superiori rispetto al Sud³ e inferiori rispetto al Nord.

L'analisi per età al decesso evidenzia una bassissima mortalità nella popolazione infantile (0,26%), mentre circa il 56% dei decessi si verifica fra 20 e 75 anni e circa il 44% dopo i 75 anni d'età.

Indicatori di qualità

L'86% dei casi incidenti è stato confermato su base cito-istologica, a garanzia della qualità dei dati, circa il 12% è stato confermato su base strumentale e solo l'1,4% è classificato come DCO, ovvero come casi la cui conferma si fonda unicamente sulla scheda di morte.

Per quanto riguarda le sedi topografiche, in meno dell'1% dei casi è stato attribuito il codice topografico C80.9 (sede primitiva ignota), non essendo stato possibile individuare una sede precisa della neoplasia.

Conclusioni

L'elaborazione e le analisi condotte sui dati del primo triennio 2008-2010 forniscono una prima fotografia del fenomeno oncologico nella provincia di Caserta.

Così come atteso, nel sesso maschile i tassi standardizzati dimostrano che esiste un eccesso di incidenza statisticamente significativo rispetto al Sud, ma non rispetto al Nord, situando la provincia di Caserta in una posizione di rischio intermedio. Nel sesso femminile, i tassi standardizzati sono assimilabili a quelli del Sud e significativamente inferiori a quelli del Nord e dell'Italia. È comunque opportuno focalizzare l'attenzione sull'analisi sede-specifica da cui si evidenziano scostamenti in eccesso o in difetto dai valori nazionali e di macro-aree.

L'analisi dei dati conferma, altresì, un eccesso di mortalità, nei maschi, per il complesso delle patologie oncologiche rispetto a tutte le macro-aree. La mortalità per le femmine, invece, mostra una sostanziale sovrapposibilità rispetto al dato nazionale e un eccesso rispetto al Sud.


Questi dati pongono l'accento sull'importanza dei necessari miglioramenti da attuarsi nell'ambito della prevenzione e dei percorsi terapeutico-assistenziali sulla popolazione dell'intera provincia.

(1) ISTAT 01/01/2015

(2) esclusi i tumori della cute non melanomi e del SNC non maligni

(3) ITACAN - Tassi standardizzati biennio 2008-2009

(4) ISTAT 2008-2010



TUTTI I TUMORI

(ESCLUSI I CARCINOMI NON MELANOMATOSI DELLA CUTE)

TUTTI I TUMORI

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	2228	1752	3980	1220	804	2024
Numeri casi totali	6685	5255	11940	3660	2411	6071
% casi per genere	56	44	100	60.3	39.7	100
Tasso grezzo ⁽¹⁾	513.4	382.9	446.4	281.1	175.7	227
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	464.8	314.8	378.8	250.2	124.6	178.2
Rischio cum. 0-74 (%)	31.8	22.6	27	17	8.7	12.7
Rapporto M/I (%)	54.7	45.9	50.8			
VM (%)	85.7	87.4	86.5			
DCO (%)	1.2	1.8	1.4			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUTTI I TUMORI

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C00-C80 (tutte); **morfologia:** 8270-8790, 9140, 9590-9948 se topografia C44 (tumori cutanei non carcinomatosi), 8000-9989 negli altri casi (tutte le morfologie); **comportamento:** 1-2 se topografia C67 (tumori incerti e in situ della vescica), 3 (maligno, infiltrante).

TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. I TUMORI PIÙ FREQUENTI

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Tumori della mammella	10	0.1	1430	27.2	1440	12.1
Tumori del polmone	1182	17.7	236	4.5	1418	11.9
Tumori del colon-retto	762	11.4	645	12.3	1407	11.8
Tumori della vescica	974	14.6	181	3.4	1155	9.7
Tumori della prostata	933	14	-	-	933	7.8
Tumori del fegato	380	5.7	189	3.6	569	4.8
Tumori dello stomaco	293	4.4	201	3.8	494	4.1
Linfoma non Hodgkin	229	3.4	210	4	439	3.7

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE*

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




*escluse morfologie 9950-9989 (malattie mieloproliferative e sindromi mielodisplastiche)

TUTTI I TUMORI

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE*

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



*escluse morfologie 9950-9989 (malattie mieloproliferative e sindromi mielodisplastiche)



TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	113	24	137	54	8	62
Numeri casi totali	340	72	412	162	25	187
% casi sul totale	5.1	1.4	3.5	4.4	1	3.1
Tasso grezzo ⁽¹⁾	26.1	5.2	15.4	12.4	1.8	7
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	24.7	4.3	13.8	11.7	1.3	5.9
Rischio cum. 0-74 (%)	2.1	0.4	1.2	0.9	0.1	0.5
Rapporto M/I (%)	47.6	34.7	45.4			
VM (%)	94.4	95.8	94.7			
DCO (%)	0.6	2.8	1			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C00-14 (labbro, cavità orale e faringe), C30-31 (cavità nasale, orecchio medio e seni paranasali), C32 (laringe); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010

	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Squamocellulare	276	86	48	69.6	324	83.1
Adenocarcinoma	19	5.9	12	17.4	31	7.9
Carcinoma NAS	21	6.5	5	7.2	26	6.7
Altre morfologie	5	1.6	4	5.8	9	2.3


⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

MASCHI




TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

FEMMINE




TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

MASCHI




TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

FEMMINE




TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

MASCHI




TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

FEMMINE





TUMORI DELLO STOMACO

TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	98	67	165	80	56	136
Numeri casi totali	293	201	494	241	168	409
% casi sul totale	4.4	3.8	4.1	6.6	7	6.7
Tasso grezzo ⁽¹⁾	22.5	14.6	18.5	18.5	12.2	15.3
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	19.8	10.7	14.8	16.3	8.3	11.8
Rischio cum. 0-74 (%)	1.5	0.8	1.1	1.2	0.5	0.9
Rapporto M/I (%)	82.3	83.6	82.8			
VM (%)	93.2	87.1	90.7			
DCO (%)	2	2	2			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti

⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza

⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche

⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLO STOMACO

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C16 (stomaco); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Carcinoma ad anello con castone	39	14.3	26	14.9	65	14.5
Adenocarcinoma tipo intestinale	95	34.8	54	30.9	149	33.3
Adenocarcinoma NAS	97	35.5	59	33.7	156	34.8
Altri adenocarcinomi specificati	23	8.4	19	10.9	42	9.4
Altre morfologie	9	3.3	6	3.4	15	3.3
Carcinoma NAS	10	3.7	11	6.3	21	4.7

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




TUMORI DELLO STOMACO

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	254	215	469	102	105	207
Numeri casi totali	762	645	1407	306	316	622
% casi sul totale	11.4	12.3	11.8	8.4	13.1	10.2
Tasso grezzo ⁽¹⁾	58.5	47	52.6	23.5	23	23.3
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	52.2	35.8	43	20.9	15.4	17.7
Rischio cum. 0-74 (%)	4.1	2.9	3.5	1.5	1	1.2
Rapporto M/I (%)	40.2	49	44.2			
VM (%)	96.9	95.2	96.1			
DCO (%)	0.4	1.2	0.8			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Adenocarcinoma NAS	618	83.7	505	82.2	1123	83.1
Adenocarcinoma mucinoso	50	6.8	37	6.0	87	6.4
Adenocarcinoma in adenoma	42	5.7	38	6.2	80	5.9
Altri adenocarcinomi	63	8.5	58	9.4	121	8.9
Carcinoma NAS	4	0.5	4	0.7	8	0.6
Altre morfologie	11	1.5	9	1.5	20	1.5

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL FEGATO

TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	127	63	190	96	57	153
Numeri casi totali	380	189	569	288	170	458
% casi sul totale	5.7	3.6	4.8	7.9	7.1	7.5
Tasso grezzo ⁽¹⁾	29.2	13.8	21.3	22.1	12.4	17.1
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	26.5	9.6	17.4	19.9	7.9	13.4
Rischio cum. 0-74 (%)	2.4	0.8	1.6	1.8	0.6	1.1
Rapporto M/I (%)	75.8	89.9	80.5			
VM (%)	28.9	26.5	28.1			
DCO (%)	2.1	5.3	3.2			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti

⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza

⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche

⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL FEGATO

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C22 (fegato e dotti biliari intraepatici); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Epatocarcinoma	89	80.9	26	52	115	71.9
Colangiocarcinoma	18	16.4	19	38	37	23.1
Carcinoma NAS	0	0	2	4	2	1.2
Altre morfologie	1	0.9	1	2	2	1.2
Non specificato	2	1.8	2	4	4	2.5

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010



TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




TUMORI DEL FEGATO

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELLE VIE BILIARI

TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010


	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	27	41	68	17	28	44
Numeri casi totali	81	123	204	50	83	133
% casi sul totale	1.2	2.3	1.7	1.4	3.4	2.2
Tasso grezzo ⁽¹⁾	6.2	9	7.6	3.8	6	5
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	5.7	6.5	6	3.5	4.4	4
Rischio cum. 0-74 (%)	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3
Rapporto M/I (%)	61.7	67.5	65.2			
VM (%)	64.2	65.9	65.2			
DCO (%)	2.5	2.4	2.5			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



TUMORI DELLE VIE BILIARI

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C23 (colecisti), C24 (altre sedi delle vie biliari); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Colangiocarcinoma	43	82.7	67	82.7	67	82.7
Altre morfologie	1	1.9	5	6.2	5	6.2
Carcinoma NAS	8	15.4	6	7.4	6	7.4
Non specificato	0	0	3	3.7	3	3.7

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010




TUMORI DELLE VIE BILIARI

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL PANCREAS

TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	46	44	90	46	42	88
Numeri casi totali	137	133	270	137	127	264
% casi sul totale	2	2.5	2.3	3.7	5.3	4.3
Tasso grezzo ⁽¹⁾	10.5	9.7	10.1	10.5	9.3	9.9
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	9.7	6.9	8.3	9.7	6.6	8
Rischio cum. 0-74 (%)	0.8	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7
Rapporto M/I (%)	100	95.5	97.8			
VM (%)	60.6	49.6	55.2			
DCO (%)	4.4	4.5	4.4			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL PANCREAS

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-0-3)

Topografia: C25 (pancreas); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Adenocarcinoma	69	83.1	56	84.8	125	83.9
Tumore neuroendocrino	2	2.4	3	4.5	5	3.4
Carcinoma NAS	6	7.2	7	10.6	13	8.7
Altre morfologie	3	3.6	0	0	3	2
Non specificato	3	3.6	0	0	3	2

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010



TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



TUMORI DEL PANCREAS

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELLA LARINGE

TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	67	5	72	31	3	34
Numeri casi totali	202	14	216	94	9	103
% casi sul totale	3	0.3	1.8	2.6	0.4	1.7
Tasso grezzo ⁽¹⁾	15.5	1	8.1	7.2	0.7	3.9
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	14.8	0.9	7.3	6.7	0.5	3.1
Rischio cum. 0-74 (%)	1.3	0.1	0.7	0.5	-	0.2
Rapporto M/I (%)	46.5	64.3	47.7			
VM (%)	94.6	92.9	94.4			
DCO (%)	1	7.1	1.4			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti

⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza

⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche

⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Squamocellulare	180	94.2	13	100	193	94.6
Carcinoma NAS	11	5.8	0	0	11	5.4

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




TUMORI DELLA LARINGE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





MESOTELIOMI

MESOTELIOMI

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	5	1	7	5	0	5
Numeri casi totali	16	4	20	14	1	15
% casi sul totale	0.2	0.1	0.2	0.4	0	0.2
Tasso grezzo⁽¹⁾	1.2	0.3	0.7	1.1	0.1	0.6
Tasso sta (EUR)⁽¹⁾	1.1	0.2	0.6	1	0.1	0.5
Rischio cum. 0-74 (%)	0.1	-	-	0.1	-	-
Rapporto M/I (%)	87.5	25	75			
VM (%)	100	100	100			
DCO (%)	0	0	0			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

MESOTELIOMI

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C00-80 (tutte); **morfologia:** 9050-9055 (neoplasie mesoteliali); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

MESOTELIOMI

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Mesotelioma epitelioide	9	56.2	2	50	11	55
Mesotelioma maligno NAS	6	37.5	2	50	8	40
Mesotelioma, tipo bifasico	1	6.2	0	0	1	5

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

MESOTELIOMI

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



MESOTELIOMI

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



MESOTELIOMI

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



MESOTELIOMI

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



MESOTELIOMI

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



MESOTELIOMI

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL POLMONE

TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010


	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	394	79	473	368	67	436
Numeri casi totali	1182	236	1418	1105	202	1307
% casi sul totale	17.7	4.5	11.9	30.2	8.4	21.5
Tasso grezzo ⁽¹⁾	90.8	17.2	53	84.9	14.7	48.9
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	81.4	14.4	44.3	75.2	11.6	39.7
Rischio cum. 0-74 (%)	6.7	1.2	3.8	6.1	1	3.4
Rapporto M/I (%)	93.5	85.6	92.2			
VM (%)	77.9	80.9	78.4			
DCO (%)	1.8	2.5	1.9			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



TUMORI DEL POLMONE

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C33 (trachea), C34 (bronco e polmone); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Squamocellulare	304	33.0	34	17.8	338	30.4
Adenocarcinoma	299	32.5	86	45.0	385	34.6
Non a piccole cellule	94	10.2	17	8.9	111	10.0
Piccole cellule	113	12.3	29	15.2	142	12.8
Carcinoma NAS	60	6.5	10	5.2	70	6.3
Altre morfologie	43	4.7	12	6.3	55	4.9
Non specificato	8	0.9	3	1.6	11	1.0

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010




TUMORI DEL POLMONE

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





MELANOMI DELLA CUTE

MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	36	39	76	11	10	21
Numeri casi totali	109	118	227	32	31	63
% casi sul totale	1.6	2.2	1.9	0.9	1.3	1
Tasso grezzo⁽¹⁾	8.4	8.6	8.5	2.5	2.3	2.4
Tasso sta (EUR)⁽¹⁾	7.7	7.5	7.5	2.3	1.7	1.9
Rischio cum. 0-74 (%)	0.6	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1
Rapporto M/I (%)	29.4	26.3	27.8			
VM (%)	99.1	100	99.6			
DCO (%)	0	0	0			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

MELANOMI DELLA CUTE

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C44 (cute); **morfologia:** 8720-8790 (melanomi); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Melanoma a diff. superficiale	29	26.9	30	25.4	59	26.1
Melanoma nodulare	12	11.1	13	11	25	11.1
Lentigo maligna	2	1.9	1	0.8	3	1.3
Accraie lentiginoso	0	0	3	2.5	3	1.3
Altre morfologie	54	50	54	45.8	108	47.8
Melanoma NAS	11	10.2	17	14.4	28	12.4

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



MELANOMI DELLA CUTE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELLA MAMMELLA

TUMORI DELLA MAMMELLA

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	3	477	480	2	138	140
Numeri casi totali	10	1430	1440	7	414	421
% casi sul totale	0.1	27.2	12.1	0.2	17.2	6.9
Tasso grezzo ⁽¹⁾	0.8	104.2	53.8	0.5	30.2	15.7
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	0.7	91.2	48.3	0.5	23.1	12.9
Rischio cum. 0-74 (%)	0.1	7.3	3.9	0	1.7	0.9
Rapporto M/I (%)	70	29	29.2			
VM (%)	100	97.8	97.8			
DCO (%)	0	0.6	0.6			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLA MAMMELLA

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Duttale	10	100.0	1004	71.8	1014	72.0
Lobulare	0	0.0	172	12.3	172	12.2
Mucinoso	0	0.0	26	1.9	26	1.8
Tubulare	0	0.0	11	0.8	11	0.8
Papillare	0	0.0	9	0.6	9	0.6
Altre morfologie	0	0.0	141	10.1	141	10.0
Carcinoma NAS	0	0.0	29	2.1	29	2.1
Non specificato	0	0.0	6	0.4	6	0.4

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLA MAMMELLA

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA MAMMELLA

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA MAMMELLA

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno		28			3	
Numeri casi totali		84			10	
% casi sul totale		1.6			0.4	
Tasso grezzo ⁽¹⁾		6.1			0.7	
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾		5.5			0.6	
Rischio cum. 0-74 (%)		0.5			-	
Rapporto M/I (%)		11.9				
VM (%)		98.8				
DCO (%)		0				

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C53 (collo dell'utero); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Squamocellulare NAS			60	72.3		
Squamocellulare microinvasivo			1	1.2		
Adenocarcinoma			14	16.9		
Altre morfologie			5	6		
Carcinoma NAS			3	3.6		

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno		92			7	
Numeri casi totali		277			21	
% casi sul totale		5.3			0.9	
Tasso grezzo ⁽¹⁾		20.2			1.5	
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾		17.5			1.2	
Rischio cum. 0-74 (%)		1.6			0.1	
Rapporto M/I (%)		7.6				
VM (%)		98.9				
DCO (%)		0				

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Adenocarcinoma			254	92.7		
Carcinoma NAS			3	1.1		
Sarcoma			10	3.6		
Altre morfologie			7	2.6		

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELL'OVAIO

TUMORI DELL'OVAIO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno		59			26	
Numeri casi totali		176			77	
% casi sul totale		3.3			3.2	
Tasso grezzo ⁽¹⁾		12.8			5.6	
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾		11.2			4.4	
Rischio cum. 0-74 (%)		0.9			0.4	
Rapporto M/I (%)		43.8				
VM (%)		92				
DCO (%)		1.7				

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELL'OVAIO

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C56 (ovaio); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DELL'OVAIO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Sieroso			72	44.4		
Mucinoso			13	8		
Endometriode			19	11.7		
Altri adenocarcinomi			33	20.4		
Altre morfologie			14	8.6		
Non specificato			11	6.8		

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELL'OVAIO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELL'OVAIO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010




TUMORI DELL'OVAIO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELLA PROSTATA

TUMORI DELLA PROSTATA

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	311			99		
Numeri casi totali	933			297		
% casi sul totale	14			8.1		
Tasso grezzo ⁽¹⁾	71.6			22.8		
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	63			19.5		
Rischio cum. 0-74 (%)	5.3			0.7		
Rapporto M/I (%)	31.8					
VM (%)	93.4					
DCO (%)	1.7					

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti

⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza

⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche

⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLA PROSTATA

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C61 (prostata); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DELLA PROSTATA

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010

	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Adenocarcinoma NAS	578	66.4				
Carcinoma a cellule acinose	283	32.5				
Non specificato	1	0.1				


⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLA PROSTATA

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

MASCHI




TUMORI DELLA PROSTATA

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

MASCHI





TUMORI DELLA PROSTATA

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

MASCHI





TUMORI DEL TESTICOLO

TUMORI DEL TESTICOLO

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	33			1		
Numeri casi totali	99			2		
% casi sul totale	1.5			0.1		
Tasso grezzo ⁽¹⁾	7.6			0.2		
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	7.2			0.1		
Rischio cum. 0-74 (%)	0.5			-		
Rapporto M/I (%)	2					
VM (%)	98					
DCO (%)	0					

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL TESTICOLO

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C62 (testicolo); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DEL TESTICOLO

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Seminoma	51	52.6				
Embrionale	20	20.6				
Teratoma	19	19.6				
Coriocarcinoma	1	1				
Altre morfologie	6	6.2				

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL TESTICOLO

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL TESTICOLO

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010




TUMORI DEL TESTICOLO

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	65	39	104	23	10	34
Numeri casi totali	196	117	313	70	31	101
% casi sul totale	2.9	2.2	2.6	1.9	1.3	1.7
Tasso grezzo ⁽¹⁾	15.1	8.5	11.7	5.4	2.3	3.8
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	13.9	7.1	10.3	4.6	1.6	2.9
Rischio cum. 0-74 (%)	1.2	0.6	0.9	0.4	0.1	0.2
Rapporto M/I (%)	35.7	26.5	32.3			
VM (%)	91.3	84.6	88.8			
DCO (%)	1	0	0.6			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C64 (rene), C65-66 (pelvi renale e uretere), C68 (altri e non specificati organi urinari);
morfologia: 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Carcinoma a cellule chiare	75	49	36	41.9	111	46.4
Adenocarcinoma papillare	12	7.8	2	2.3	14	5.9
Carcinoma cromofobo	9	5.9	15	17.4	24	10
Carcinoma a cellule renali NAS	51	33.3	24	27.9	75	31.4
Carcinoma NAS	2	1.3	4	4.7	6	2.5
Altre morfologie	4	2.6	4	4.7	8	3.3

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010



TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




TUMORI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELLA VESCICA

TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	325	60	385	75	19	94
Numeri casi totali	974	181	1155	225	57	282
% casi sul totale	14.6	3.4	9.7	6.1	2.4	4.6
Tasso grezzo ⁽¹⁾	74.8	13.2	43.2	17.3	4.2	10.5
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	67.6	10.1	35.9	15.4	2.7	7.9
Rischio cum. 0-74 (%)	5.3	0.9	3	1	0.2	0.5
Rapporto M/I (%)	23.1	31.5	24.4			
VM (%)	96.2	95	96			
DCO (%)	0	1.1	0.2			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLA VESCICA

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C67 (vescica); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 1-3 (incerto, in situ e maligno, infiltrante).

TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Uroteliale papillare infiltrante	285	30.4	43	25	328	29.6
Uroteliale papill. non infiltrante	431	46	81	47.1	512	46.2
Uroteliale NAS, infiltrante	146	15.6	32	18.6	178	16.1
Uroteliale NAS, non infiltrante	48	5.1	10	5.8	58	5.2
Altre morfologie	24	2.6	4	2.3	28	2.5
Non specificato	3	0.3	2	1.2	5	0.5

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



TUMORI DELLA VESCICA

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	34	36	69	23	19	41
Numeri casi totali	101	107	208	68	56	124
% casi sul totale	1.5	2	1.7	1.9	2.3	2
Tasso grezzo ⁽¹⁾	7.8	7.8	7.8	5.2	4.1	4.6
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	7.4	6.6	7	4.9	3.2	4
Rischio cum. 0-74 (%)	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3
Rapporto M/I (%)	67.3	52.3	59.6			
VM (%)	68.3	63.6	65.9			
DCO (%)	1	3.7	2.4			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Glioblastoma	42	60.9	38	55.9	80	58.4
Astrocitoma	7	10.1	12	17.6	19	13.9
Oligodendroglioma	6	8.7	4	5.9	10	7.3
Ependimoma	3	4.3	1	1.5	4	2.9
Medulloblastoma	2	2.9	4	5.9	6	4.4
Altre morfologie	9	13	8	11.8	17	12.4
Non specificato	0	0	1	1.5	1	0.7

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010




TSD (Europa) per 100.000

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010




TSD (Europa) per 100.000

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





TUMORI DELLA TIROIDE

TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	24	83	107	3	4	6
Numeri casi totali	73	249	322	8	11	19
% casi sul totale	1.1	4.7	2.7	0.2	0.5	0.3
Tasso grezzo ⁽¹⁾	5.6	18.1	12	0.6	0.8	0.7
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	5.3	17.5	11.5	0.5	0.6	0.6
Rischio cum. 0-74 (%)	0.4	1.3	0.9	-	0.1	-
Rapporto M/I (%)	11	4.4	5.9			
VM (%)	94.5	98	97.2			
DCO (%)	1.4	0	0.3			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

TUMORI DELLA TIROIDE

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C73 (tiroide); **morfologia:** 8000-9044, 9060-9136, 9141-9582 (tutte le morfologie esclusi mesoteliomi, sarcoma di Kaposi e neoplasie ematologiche); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Papillare	54	78.3	208	85.2	262	83.7
Follicolare	11	15.9	15	6.1	26	8.3
Carcinoma a cell. Hürthle	1	1.4	7	2.9	8	2.6
Midollare	2	2.9	9	3.7	11	3.5
Anaplastico	0	0	2	0.8	2	0.6
Altre morfologie	1	1.4	3	1.2	4	1.3

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA, TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA, TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




TUMORI DELLA TIROIDE

INCIDENZA, RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





LINFOMI DI HODGKIN

LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	15	17	33	1	1	3
Numeri casi totali	46	52	98	4	4	8
% casi sul totale	0.7	1	0.8	0.1	0.2	0.1
Tasso grezzo ⁽¹⁾	3.5	3.8	3.7	0.3	0.3	0.3
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	3.4	3.7	3.6	0.3	0.2	0.2
Rischio cum. 0-74 (%)	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Rapporto M/I (%)	8.7	7.7	8.2	-	-	-
VM (%)	100	100	100	-	-	-
DCO (%)	0	0	0	-	-	-

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

LINFOMI DI HODGKIN

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C00-C80 (tutte); **morfologia:** 9650-9667 (linfomi di Hodgkin); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010

	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Predominanza linfocitaria	6	13	4	7.7	10	10.2
Sclerosi nodulare	26	56.5	33	63.5	59	60.2
Cellularità mista	3	6.5	7	13.5	10	10.2
Deplezione linfocitaria	1	2.2	1	1.9	2	2
Non specificato	10	21.7	7	13.5	17	17.3


⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

MASCHI




LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

FEMMINE




LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

MASCHI




LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

FEMMINE



LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

MASCHI





LINFOMI DI HODGKIN

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

FEMMINE





LINFOMI NON HODGKIN

LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	76	70	146	26	23	48
Numeri casi totali	229	210	439	77	68	145
% casi sul totale	3.4	4	3.7	2.1	2.8	2.4
Tasso grezzo ⁽¹⁾	17.6	15.3	16.4	5.9	5	5.4
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	16.5	12.9	14.5	5.5	3.6	4.5
Rischio cum. 0-74 (%)	1.4	1.1	1.2	0.5	0.3	0.4
Rapporto M/I (%)	33.6	32.4	33			
VM (%)	95.6	95.2	95.4			
DCO (%)	0.9	1	0.9			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

LINFOMI NON HODGKIN

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C00-C80 (tutte); **morfologia:** 9590-9596 (linfomi NAS), 9670-9729 (linfomi non Hodgkin), 9760-9764 (malattie immunoproliferative), 9940 (leucemia a cellule capellute), 9948 (leucemia aggressiva a cellule NK); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Cellule B, Indolenti follicolari	32	14.6	37	18.5	69	16.5
Cellule B, indolenti non follicolari	43	19.6	36	18	79	18.9
Cellule B, Aggressivi	92	42	86	43	178	42.5
Cellule T, Indolenti	4	1.8	2	1	6	1.4
Cellule T, Aggressivi	8	3.7	7	3.5	15	3.6
Non specificato	37	16.9	31	15.5	68	16.2
Linfomi dei precursori	3	1.4	1	0.5	4	1

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE


ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)




LINFOMI NON HODGKIN

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)





MIELOMI

MIELOMI

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	19	18	38	12	11	23
Numeri casi totali	58	55	113	36	32	68
% casi sul totale	0.9	1	0.9	1	1.3	1.1
Tasso grezzo ⁽¹⁾	4.5	4	4.2	2.8	2.3	2.5
Tasso sta (EUR) ⁽¹⁾	4	3.1	3.5	2.3	1.5	1.9
Rischio cum. 0-74 (%)	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
Rapporto M/I (%)	62.1	58.2	60.2			
VM (%)	84.5	78.2	81.4			
DCO (%)	1.7	1.8	1.8			

⁽¹⁾ per 100.000 abitanti
⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza
⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche
⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso

MIELOMI

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-O-3)

Topografia: C00-C80 (tutte); **morfologia:** 9731-9734 (tumori plasmacellulari); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

MIELOMI

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010

	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Mieloma multiplo	42	85.7	40	93	82	89.1
Plasmocitoma NAS	5	10.2	2	4.7	7	7.6
Plasmocitoma extramidollare	2	4.1	1	2.3	3	3.3


⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

MIELOMI

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

MASCHI




MIELOMI

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ

ANNI 2008-2010

FEMMINE




MIELOMI

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

MASCHI




MIELOMI

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO

ANNI 2008-2010

FEMMINE




MIELOMI

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

MASCHI




MIELOMI

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)

FEMMINE





LEUCEMIE

LEUCEMIE

INCIDENZA E MORTALITÀ: SINTESI DEI DATI

ANNI 2008-2010

	INCIDENZA			MORTALITÀ		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Numero casi/anno	59	42	102	39	32	71
Numeri casi totali	178	127	305	117	97	214
% casi sul totale	2.7	2.4	2.6	3.2	4	3.5
Tasso grezzo⁽¹⁾	13.7	9.3	11.4	9	7.1	8
Tasso sta (EUR)⁽¹⁾	12.7	6.9	9.7	7.8	4.8	6.2
Rischio cum. 0-74 (%)	1	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5
Rapporto M/I (%)	65.7	76.4	70.2	⁽¹⁾ per 100.000 abitanti		
VM (%)	80.9	76.4	79	⁽²⁾ M/I = Mortalità/Incidenza		
DCO (%)	1.1	3.1	2	⁽³⁾ VM = Verifiche Microscopiche		
				⁽⁴⁾ DCO = Solo certificati di decesso		

LEUCEMIE

CRITERI DI SELEZIONE (CLASSIFICAZIONE ICD-0-3)

Topografia: C00-C80 (tutte); **morfologia:** 9800-9931 (leucemie NAS, leucemie linfoidi, mieloidi), 9945-9946 (leucemia mielomonocitica); **comportamento:** 3 (maligno, infiltrante).

LEUCEMIE

INCIDENZA. GRUPPI MORFOLOGICI PIÙ FREQUENTI⁽¹⁾

ANNI 2008-2010


	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
Linfatica acuta	15	10.4	9	9.3	24	10
Linfatica cronica	33	22.9	21	21.6	54	22.4
Mieloide acuta	63	43.8	40	41.2	103	42.7
Mieloide cronica	24	16.7	15	15.5	39	16.2
Leucemia NAS	9	6.2	12	12.4	21	8.7

⁽¹⁾ Sul totale della casistica con verifica microscopica, esame biomolecolare o citogenetico

LEUCEMIE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



LEUCEMIE

INCIDENZA. TASSI E FREQUENZE PER ETÀ


ANNI 2008-2010



LEUCEMIE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



LEUCEMIE

INCIDENZA. TASSI STANDARDIZZATI PER DISTRETTO


ANNI 2008-2010



LEUCEMIE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



LEUCEMIE

INCIDENZA. RAPPORTO TRA CASI OSSERVATI E ATTESI RISPETTO AL DATO NAZIONALE

ANNI 2008-2010 (FONTE: ITACAN - AIRTUM 2008-2009)



APPENDICE



Tabella 1a - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010

Incidenza. Distribuzione della frequenza assoluta dei casi per tipo di tumore e fascia di età.
Età media e mediana alla diagnosi.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lingua	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3
Bocca	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6
Ghiandole salivari	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
Rinofaringe	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Stomaco	-	-	-	-	-	1	3	4	7	11	26
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
Colon	-	-	-	-	-	1	3	9	16	11	24
Retto	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	16
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	12
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
Pancreas	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	11
Cavità nasale	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	28
Polmone	-	-	1	-	-	1	3	1	11	34	59
Altri organi toracici	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Osso	-	-	1	3	3	-	1	-	2	-	1
Pelle, melanomi	-	-	-	1	-	1	4	10	9	7	7
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	-	-	2	1	8	15	20	28	52
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Tessuti molli	-	1	1	2	3	1	1	1	-	1	2
Mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Pene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	25
Testicolo	1	-	-	7	16	14	24	20	12	1	1
Altri genitali maschili	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene	1	-	-	1	-	1	1	5	5	15	19
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	27
Vescica (non maligni)	-	-	-	-	2	3	7	7	6	30	46
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
Occhio	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Encefalo e altro SNC (maligni)	2	-	4	-	1	5	2	5	2	6	11
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	3	2	3	3	1	1	9	7	9	9
Tiroide	-	-	-	2	3	3	4	9	7	7	7
Altre ghiandole endocrine	4	2	1	-	3	1	2	1	3	3	1
Linfoma di Hodgkin	-	1	3	6	7	5	4	4	2	1	5
Linfoma non Hodgkin	2	-	4	4	1	4	2	8	12	16	17
Mieloma	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	4
Leucemia linfatica acuta	4	-	2	2	-	1	2	-	-	-	1
Leucemia linfatica cronica	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
Leucemia mieloide acuta	-	1	4	-	3	2	3	3	-	2	3
Leucemia mieloide cronica	1	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1
^(c) Altre MMPC e SMD	-	2	-	-	3	-	3	2	5	3	10
Leucemie NAS	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3
Miscellanea	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Mal definite e metastasi	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	6
Totale	23	10	23	33	52	56	90	129	171	286	471
Totale escluso ^(a)(^b)	18	7	21	30	47	54	81	105	144	249	410
Totale escluso ^(a)(^b)(^c)	18	5	21	30	44	54	78	103	139	246	400

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale	Età media	Età mediana	Sede
-	1	1	1	2	2	-	8	71.8	74	Labbro
1	2	3	5	1	1	1	26	58.5	60	Lingua
5	5	4	5	3	2	-	38	59.9	58	Bocca
-	3	-	1	4	2	1	18	62	62	Ghiandole salivari
1	2	2	1	1	-	-	14	57.6	56.5	Orofaringe
3	1	-	2	1	1	-	14	54.5	56.5	Rinofaringe
-	-	1	-	2	-	-	6	62	61.5	Ipofaringe
-	-	1	-	-	-	-	4	52.8	51.5	Faringe NAS
2	5	1	5	4	4	-	29	64.2	64	Esofago
19	29	34	53	57	39	10	293	67.9	71	Stomaco
1	3	3	1	3	2	2	22	64.5	64.5	Intestino tenue
46	71	90	94	98	57	20	540	68.1	69	Colon
27	29	24	33	40	28	10	222	67.9	69.5	Retto
35	58	86	77	51	29	13	380	68	68	Fegato
3	11	16	10	13	9	12	81	71.5	72	Vie biliari
14	25	26	18	18	12	5	137	66.6	67	Pancreas
3	-	1	2	-	-	-	10	56.7	59	Cavità nasale
25	40	38	20	19	11	7	202	64.1	64	Laringe
100	184	204	221	206	113	44	1182	68.5	69	Polmone
1	2	6	2	3	1	2	21	66.6	67	Altri organi toracici
-	1	-	-	-	-	-	12	29.2	21.5	Osso
14	13	13	12	10	7	1	109	58.9	61	Pelle, melanomi
69	128	132	152	159	129	60	955	68.5	70	^(a) Pelle, non melanomi
1	2	5	-	4	1	-	16	64.2	66.5	Mesotelioma
3	3	3	4	5	3	2	26	68	71	Sarcoma di Kaposi
1	3	1	4	3	1	1	27	50.5	59	Tessuti molli
-	1	-	3	2	-	1	10	65.8	71	Mammella
2	2	-	4	3	1	2	14	72.6	72.5	Pene
58	117	186	206	184	106	43	933	70.9	71	Prostata
-	-	2	-	1	-	-	99	32.4	32.5	Testicolo
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Altri genitali maschili
13	23	26	22	21	11	3	167	62.6	64	Rene
38	57	86	69	70	82	32	484	69.8	70	Vescica (maligni)
58	64	79	68	58	49	13	490	64.7	66	Vescica (non maligni)
4	3	5	3	6	2	1	29	66.6	67	Altre vie urinarie
-	-	1	1	3	1	-	10	59.3	71.5	Occhio
13	9	13	10	10	7	1	101	56.7	59	Encefalo e altro SNC (maligni)
10	7	9	8	7	4	3	100	51.5	53	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
8	11	2	5	5	-	-	73	49.8	52	Tiroide
1	5	3	1	-	1	-	32	42.2	44.5	Altre ghiandole endocrine
2	-	1	3	-	2	-	46	35.9	32	Linfoma di Hodgkin
23	37	28	30	19	14	8	229	59.8	62	Linfoma non Hodgkin
8	5	7	8	14	6	1	58	66.4	69.5	Mieloma
-	1	-	-	-	2	-	15	30.4	21	Leucemia linfatica acuta
3	7	5	5	4	2	1	33	64.3	65	Leucemia linfatica cronica
4	5	6	9	12	6	-	63	57.8	65	Leucemia mieloide acuta
-	5	4	2	3	-	-	24	55.7	63	Leucemia mieloide cronica
11	9	18	18	34	15	13	146	67.2	72	^(c) Altre MMPC e SMD
3	3	8	10	2	3	4	43	64.7	68	Leucemie NAS
-	-	-	-	2	1	-	7	46.4	41	Miscellanea
16	12	20	25	26	17	10	141	69.1	71	Mal definite e metastasi
649	1004	1204	1233	1193	786	327	7740	66	68	Totale
570	869	1063	1073	1027	653	264	6685	65.8	68	Totale escluso ^(a) (b)
559	860	1045	1055	993	638	251	6539	65.8	68	Totale escluso ^(a) (b)(c)

**Tabella 1b - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010**

Incidenza. Distribuzione della frequenza assoluta dei casi per tipo di tumore e fascia di età.
Età media e mediana alla diagnosi.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Bocca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Ghiandole salivari	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Rinofaringe	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomaco	-	-	-	-	-	-	3	3	3	10	12
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Colon	-	-	-	-	1	-	3	7	11	24	29
Retto	-	-	-	-	-	2	5	2	3	11	7
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Pancreas	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3
Cavità nasale	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Polmone	-	-	-	-	1	4	3	2	4	10	31
Altri organi toracici	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2
Osso	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-
Pelle, melanomi	-	-	1	-	5	3	5	6	16	15	8
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	1	-	4	4	4	16	21	34	48
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tessuti molli	1	1	-	1	-	1	1	1	-	2	2
Mammella	-	-	-	-	3	12	32	81	156	200	132
Utero, collo	2	1	-	-	-	1	2	1	2	9	10
Utero, corpo	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2
Utero NAS	-	-	1	-	-	1	1	3	3	6	9
Ovaio	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Altri genitali femminili	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Rene	4	2	2	1	3	-	2	8	5	3	12
Vescica (maligni)	5	2	2	2	-	3	2	10	10	12	16
Vescica (non maligni)	-	-	-	8	17	16	20	30	36	32	29
Altre vie urinarie	2	1	3	-	-	3	5	3	2	2	5
Occhio	-	-	1	8	8	8	9	2	2	3	2
Encefalo e altro SNC (maligni)	-	1	1	1	4	4	5	6	13	18	13
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4
Tiroide	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre ghiandole endocrine	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Linfoma di Hodgkin	1	-	-	-	1	-	3	1	2	3	2
Linfoma non Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Mieloma	-	-	-	-	-	7	1	7	4	4	8
Leucemia linfatica acuta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Leucemia linfatica cronica	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Leucemia mieloide acuta	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5
Leucemia mieloide cronica	22	10	13	23	49	76	122	218	338	474	472
^(c) Altre MMPC e SMD	17	8	10	21	45	69	116	192	307	428	408
Leucemie NAS	17	8	10	21	45	62	115	185	303	424	400
Miscellanea	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Mal definite e metastasi	2	1	-	-	-	-	-	3	5	10	6
Totale	60	41	43	53	106	183	405	808	1365	1932	2069
Totale escluso ^(a)(b)	56	34	37	49	102	158	350	703	1172	1675	1805
Totale escluso ^(a)(b)(c)	56	34	35	45	102	157	345	698	1168	1667	1797

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale	Età media	Età mediana	Sede
-	-	1	-	1	1	-	3	76.7	79	Labbro
1	2	1	-	1	2	1	11	63.6	64	Lingua
5	1	1	5	1	3	1	20	67.3	68.5	Bocca
1	1	-	-	3	1	1	9	66.3	77	Ghiandole salivari
-	-	2	-	-	-	-	4	57.5	59	Orofaringe
-	-	2	-	-	-	-	3	53	66	Rinofaringe
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Ipofaringe
1	-	1	-	-	-	-	3	57.3	59	Faringe NAS
1	-	2	1	-	1	4	9	78.2	84	Esofago
15	16	21	27	35	32	24	201	70	73	Stomaco
-	-	2	-	1	4	1	11	69.4	75	Intestino tenue
40	42	66	80	76	59	34	472	68.3	70	Colon
17	13	21	26	29	23	14	173	67.5	72	Retto
8	17	36	39	27	39	16	189	73	73	Fegato
7	13	21	24	22	15	14	123	71.8	72	Vie biliari
3	18	17	23	24	17	19	133	71.8	73	Pancreas
-	-	-	1	1	1	-	5	54.4	72	Cavità nasale
2	3	2	3	-	1	1	14	65.6	63	Laringe
28	24	41	28	26	24	10	236	64.7	66	Polmone
1	-	-	-	-	-	-	8	39.9	39	Altri organi toracici
-	-	1	2	1	-	-	10	47.9	41.5	Osso
3	14	11	12	9	5	5	118	55.7	54.5	Pelle, melanomi
41	66	97	119	120	103	90	768	69.2	71	^(a) Pelle, non melanomi
-	1	-	-	2	-	-	4	67.2	68.5	Mesotelioma
1	3	-	3	3	3	2	16	72.8	73	Sarcoma di Kaposi
1	-	3	1	1	1	1	18	49.6	52	Tessuti molli
143	155	148	142	98	73	55	1430	58.4	58	Mammella
11	11	19	11	10	9	4	103	62.1	65	Utero, collo
3	8	12	17	11	11	12	85	70.8	72	Utero, corpo
5	13	13	15	11	12	3	96	64.6	67	Utero NAS
1	-	3	-	4	3	2	14	72.8	77.5	Ovaio
1	-	1	1	2	1	-	9	61.9	65	Altri genitali femminili
11	4	9	7	13	16	5	107	58.8	61	Rene
16	18	21	23	21	9	9	181	59.4	63	Vescica (maligni)
25	14	6	6	5	5	-	249	44.9	44	Vescica (non maligni)
1	1	3	3	1	2	2	39	48.1	48	Altre vie urinarie
2	1	1	1	3	1	-	52	35.9	30	Occhio
25	27	16	28	22	19	7	210	60.7	62	Encefalo e altro SNC (maligni)
4	11	4	10	8	8	1	55	67.2	68	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
2	1	-	-	1	-	-	9	30.1	9	Tiroide
3	4	4	-	5	3	-	21	67.1	66	Altre ghiandole endocrine
1	1	3	5	5	8	4	40	63.9	70.5	Linfoma di Hodgkin
2	3	2	2	1	2	-	15	63.9	62	Linfoma non Hodgkin
8	3	11	16	22	18	4	113	64.8	72	Mieloma
-	3	2	8	5	13	8	42	75.8	78.5	Leucemia linfatica acuta
-	1	-	-	-	-	-	4	27.2	23	Leucemia linfatica cronica
7	12	17	13	21	36	26	145	74.3	78	Leucemia mieloide acuta
526	614	711	777	724	630	405	6204	63.2	66	Leucemia mieloide cronica
469	530	593	635	583	518	306	5255	62.5	65	^(c) Altre MMPC e SMD
461	527	582	619	561	500	302	5142	62.4	64	Leucemie NAS
-	-	-	1	-	-	1	9	34	24	Miscellanea
11	15	36	35	56	84	126	390	77,3	81	Mal definite e metastasi
2478	3060	3526	3742	3741	3175	2688	29475	65,6	68	Totale
2172	2675	3017	3125	3077	2610	2133	24950	65,2	67	Totale escluso ^(a) (b)
2151	2650	2993	3073	3023	2543	2092	24629	65,1	67	Totale escluso ^(a) (b)(c)

**Tabella 2a - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010**

Incidenza. Tassi (x100.000) per tipo di tumore e fascia di età. Tasso grezzo (TG), Tasso standardizzato diretto (TSD, standard: pop. Europea). Errore standard (ES) del TSD.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Lingua	-	-	-	-	-	1.1	1	-	2.8	4.2	3.7
Bocca	-	-	-	-	-	-	1	1	2.8	3.2	7.3
Ghiandole salivari	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1	3.7
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.1	3.7
Rinofaringe	-	-	-	-	-	2.2	-	1	1.9	-	1.2
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	1.2
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	2.4
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.1	4.9
Stomaco	-	-	-	-	-	1.1	3.1	3.9	6.6	11.6	31.8
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.1	4.9
Colon	-	-	-	-	-	1.1	3.1	8.8	15.2	11.6	29.3
Retto	-	-	-	-	-	-	-	2.9	1.9	10.6	19.6
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	2	3.8	13.8	14.7
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	4.2	2.4
Pancreas	-	-	-	-	-	1.1	-	1	-	6.4	13.4
Cavità nasale	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	3.2	-
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	1	3.8	9.5	34.2
Polmone	-	-	1.2	-	-	1.1	3.1	1	10.4	36	72.1
Altri organi toracici	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.1	1.2
Osso	-	-	1.2	3.3	3.3	-	1	-	1.9	-	1.2
Pelle, melanomi	-	-	-	1.1	-	1.1	4.1	9.8	8.5	7.4	8.6
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	-	-	2.2	1.1	8.1	14.7	19	29.6	63.6
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	1	-	0.9	-	1.2
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1.1	-
Tessuti molli	-	1.3	1.2	2.2	3.3	1.1	1	1	-	1.1	2.4
Mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.1	-
Pene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	6.4	30.6
Testicolo	1.3	-	-	7.7	17.7	15.2	24.4	19.6	11.4	1.1	1.2
Altri genitali maschili	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene	1.3	-	-	1.1	-	1.1	1	4.9	4.7	15.9	23.2
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	1	2	3.8	16.9	33
Vescica (non maligni)	-	-	-	-	2.2	3.3	7.1	6.9	5.7	31.8	56.2
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	3.7
Occhio	-	-	-	-	1.1	1.1	1	-	-	-	1.2
Encefalo e altro SNC (maligni)	2.6	-	4.8	-	1.1	5.4	2	4.9	1.9	6.4	13.4
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6.5	3.8	2.4	3.3	3.3	1.1	1	8.8	6.6	9.5	11
Tiroide	-	-	-	2.2	3.3	3.3	4.1	8.8	6.6	7.4	8.6
Altre ghiandole endocrine	5.2	2.5	1.2	-	3.3	1.1	2	1	2.8	3.2	1.2
Linfoma di Hodgkin	-	1.3	3.6	6.6	7.8	5.4	4.1	3.9	1.9	1.1	6.1
Linfoma non Hodgkin	2.6	-	4.8	4.4	1.1	4.3	2	7.9	11.4	16.9	20.8
Mieloma	-	-	-	-	1.1	1.1	-	-	1.9	1.1	4.9
Leucemia linfatica acuta	5.2	-	2.4	2.2	-	1.1	2	-	-	-	1.2
Leucemia linfatica cronica	-	-	-	-	-	-	1	-	1.9	2.1	1.2
Leucemia mieloide acuta	-	1.3	4.8	-	3.3	2.2	3.1	2.9	-	2.1	3.7
Leucemia mieloide cronica	1.3	-	-	1.1	-	1.1	2	1	0.9	2.1	1.2
^(c) Altre MMPC e SMD	-	2.5	-	-	3.3	-	3.1	2	4.7	3.2	12.2
Leucemie NAS	-	-	-	-	-	1.1	1	-	1.9	3.2	3.7
Miscellanea	2.6	-	-	-	-	-	-	1	0.9	-	-
Mal definite e metastasi	-	-	-	1.1	-	-	2	2	0.9	3.2	7.3
Totale	30.1	12.6	27.8	36.1	57.6	60.7	91.6	126.6	162	302.7	575.8
Totale escluso ^{(a)(b)}	23.6	8.8	25.4	32.8	52.1	58.5	82.4	103	136.4	263.6	501.3
Totale escluso ^{(a)(b)(c)}	23.6	6.3	25.4	32.8	48.8	58.5	79.4	101.1	131.7	260.4	489

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	ES (TSD)	Sede
-	1.5	1.8	2.2	5.8	9.7	-	0.6	0.5	0.2	Labbro
1.4	3	5.5	11	2.9	4.9	9	2	1.9	0.4	Lingua
6.8	7.4	7.4	11	8.7	9.7	-	2.9	2.7	0.4	Bocca
-	4.4	-	2.2	11.6	9.7	9	1.4	1.3	0.3	Ghiandole salivari
1.4	3	3.7	2.2	2.9	-	-	1.1	1	0.3	Orofaringe
4.1	1.5	-	4.4	2.9	4.9	-	1.1	1	0.3	Rinofaringe
-	-	1.8	-	5.8	-	-	0.5	0.4	0.2	Ipofaringe
-	-	1.8	-	-	-	-	0.3	0.3	0.2	Faringe NAS
2.7	7.4	1.8	11	11.6	19.4	-	2.2	2	0.4	Esofago
25.7	42.9	62.7	116.4	165.3	189.2	89.6	22.5	19.8	1.2	Stomaco
1.4	4.4	5.5	2.2	8.7	9.7	17.9	1.7	1.6	0.3	Intestino tenue
62.2	104.9	165.9	206.5	284.2	276.5	179.1	41.5	36.9	1.6	Colon
36.5	42.9	44.2	72.5	116	135.8	89.6	17	15.3	1	Retto
47.3	85.7	158.5	169.2	147.9	140.7	116.4	29.2	26.5	1.4	Fegato
4.1	16.3	29.5	22	37.7	43.7	107.5	6.2	5.7	0.6	Vie biliari
18.9	36.9	47.9	39.5	52.2	58.2	44.8	10.5	9.7	0.8	Pancreas
4.1	-	1.8	4.4	-	-	-	0.8	0.7	0.2	Cavità nasale
33.8	59.1	70	43.9	55.1	53.4	62.7	15.5	14.8	1	Laringe
135.2	271.9	376	485.5	597.3	548.2	394.1	90.8	81.4	2.4	Polmone
1.4	3	11.1	4.4	8.7	4.9	17.9	1.6	1.5	0.3	Altri organi toracici
-	1.5	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.3	Osso
18.9	19.2	24	26.4	29	34	9	8.4	7.7	0.7	Pelle, melanomi
93.3	189.1	243.3	333.9	461.1	625.8	537.4	73.3	65.3	2.1	^(a) Pelle, non melanomi
1.4	3	9.2	-	11.6	4.9	-	1.2	1.1	0.3	Mesotelioma
4.1	4.4	5.5	8.8	14.5	14.6	17.9	2	1.8	0.4	Sarcoma di Kaposi
1.4	4.4	1.8	8.8	8.7	4.9	9	2.1	2	0.4	Tessuti molli
-	1.5	-	6.6	5.8	-	9	0.8	0.7	0.2	Mammella
2.7	3	-	8.8	8.7	4.9	17.9	1.1	1	0.3	Pene
78.4	172.9	342.8	452.6	533.5	514.2	385.1	71.6	63	2.1	Prostata
-	-	3.7	-	2.9	-	-	7.6	7.2	0.7	Testicolo
-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	Altri genitali maschili
17.6	34	47.9	48.3	60.9	53.4	26.9	12.8	11.9	0.9	Rene
51.4	84.2	158.5	151.6	203	397.8	286.6	37.2	33.1	1.5	Vescica (maligni)
78.4	94.6	145.6	149.4	168.2	237.7	116.4	37.6	34.6	1.6	Vescica (non maligni)
5.4	4.4	9.2	6.6	17.4	9.7	9	2.2	2	0.4	Altre vie urinarie
-	-	1.8	2.2	8.7	4.9	-	0.8	0.7	0.2	Occhio
17.6	13.3	24	22	29	34	9	7.8	7.4	0.7	Encefalo e altro SNC (maligni)
13.5	10.3	16.6	17.6	20.3	19.4	26.9	7.7	7.5	0.8	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
10.8	16.3	3.7	11	14.5	-	-	5.6	5.3	0.6	Tiroide
1.4	7.4	5.5	2.2	-	4.9	-	2.5	2.5	0.4	Altre ghiandole endocrine
2.7	-	1.8	6.6	-	9.7	-	3.5	3.4	0.5	Linfoma di Hodgkin
31.1	54.7	51.6	65.9	55.1	67.9	71.7	17.6	16.5	1.1	Linfoma non Hodgkin
10.8	7.4	12.9	17.6	40.6	29.1	9	4.5	4	0.5	Mieloma
-	1.5	-	-	-	9.7	-	1.2	1.2	0.3	Leucemia linfatica acuta
4.1	10.3	9.2	11	11.6	9.7	9	2.5	2.3	0.4	Leucemia linfatica cronica
5.4	7.4	11.1	19.8	34.8	29.1	-	4.8	4.4	0.6	Leucemia mieloide acuta
-	7.4	7.4	4.4	8.7	-	-	1.8	1.7	0.4	Leucemia mieloide cronica
14.9	13.3	33.2	39.5	98.6	72.8	116.4	11.2	10.1	0.8	^(c) Altre MMPC e SMD
4.1	4.4	14.7	22	5.8	14.6	35.8	3.3	3.1	0.5	Leucemie NAS
-	-	-	-	5.8	4.9	-	0.5	0.5	0.2	Miscellanea
21.6	17.7	36.9	54.9	75.4	82.5	89.6	10.8	9.7	0.8	Mal definite e metastasi
877.5	1483.5	2218.9	2708.9	3459.4	3813.1	2928.8	594.4	537.6	6.2	Totale
770.7	1284.1	1959.1	2357.4	2978	3167.9	2364.5	513.4	464.8	5.8	Totale escluso ^(a) (b)
755.8	1270.8	1925.9	2317.8	2879.4	3095.1	2248.1	502.1	454.7	5.7	Totale escluso ^(a) (b)(c)

**Tabella 2b - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010**

Incidenza. Tassi (x100.000) per tipo di tumore e fascia di età. Tasso grezzo (TG), Tasso standardizzato diretto (TSD, standard: pop. Europea). Errore standard (ES) del TSD.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	-	-	-	-	-	-	1	-	0.9	1	-
Bocca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5
Ghiandole salivari	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.2
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.2
Rinofaringe	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomaco	-	-	-	-	-	-	2.9	2.8	2.7	10.1	14.1
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2	-
Colon	-	-	-	-	1.1	-	2.9	6.6	10.1	24.3	34.1
Retto	-	-	-	-	-	2.1	4.9	1.9	2.7	11.2	8.2
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	3	3.5
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	3	3.5
Pancreas	-	-	-	-	-	1.1	-	0.9	1.8	5.1	3.5
Cavità nasale	1.4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.2
Polmone	-	-	-	-	1.1	4.3	2.9	1.9	3.7	10.1	36.5
Altri organi toracici	-	-	-	1.1	-	1.1	-	1.9	0.9	-	2.4
Osso	-	-	1.3	-	-	1.1	-	2.8	-	1	-
Pelle, melanomi	-	-	1.3	-	5.7	3.2	4.9	5.6	14.7	15.2	9.4
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	1.3	-	4.5	4.3	3.9	15	19.2	34.5	56.5
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Tessuti molli	1.4	1.3	-	1.1	-	1.1	1	0.9	-	2	2.4
Mammella	-	-	-	-	3.4	12.8	31.5	75.8	143	202.7	155.3
Utero, collo	-	-	-	-	-	2.1	2.9	6.6	7.3	14.2	10.6
Utero, corpo	-	-	-	-	-	-	1	5.6	8.2	8.1	31.8
Utero NAS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2.4
Ovaio	1.4	-	-	1.1	1.1	1.1	3.9	6.6	9.2	18.2	27.1
Altri genitali femminili	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	2	3.5
Rene	2.8	1.3	-	-	-	1.1	2	0.9	1.8	9.1	11.8
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	1	-	1.8	6.1	2.4
Vescica (non maligni)	-	-	1.3	-	-	1.1	1	2.8	2.7	6.1	10.6
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Occhio	-	-	-	-	-	-	1	-	0.9	-	1.2
Encefalo e altro SNC (maligni)	5.5	2.6	2.6	1.1	3.4	-	2	7.5	4.6	3	14.1
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6.9	2.6	2.6	2.3	-	3.2	2	9.4	9.2	12.2	18.8
Tiroide	-	-	-	9.2	19.3	17.1	19.7	28.1	33	32.4	34.1
Altre ghiandole endocrine	2.8	1.3	3.8	-	-	3.2	4.9	2.8	1.8	2	5.9
Linfoma di Hodgkin	-	-	1.3	9.2	9.1	8.6	8.8	1.9	1.8	3	2.4
Linfoma non Hodgkin	-	1.3	1.3	1.1	4.5	4.3	4.9	5.6	11.9	18.2	15.3
Mieloma	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2	4.7
Leucemia linfatica acuta	4.1	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia linfatica cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.2
Leucemia mieloide acuta	1.4	-	-	-	1.1	-	2.9	0.9	1.8	3	2.4
Leucemia mieloide cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1	1.2
^(c) Altre MMPC e SMD	-	-	-	-	-	7.5	1	6.6	3.7	4.1	9.4
Leucemie NAS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.2
Miscellanea	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mal definite e metastasi	-	-	-	-	-	-	1	0.9	1.8	4.1	5.9
Totale	30.4	13.2	16.6	26.4	55.6	81.2	119.9	204.1	309.8	480.5	555.3
Totale escluso ^{(a)(b)}	23.5	10.5	12.8	24.1	51	73.7	114	179.7	281.3	433.9	480
Totale escluso ^{(a)(b)(c)}	23.5	10.5	12.8	24.1	51	66.3	113	173.2	277.7	429.8	470.6

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	ES (TSD)	Sede
-	-	1.6	-	2.1	2.8	-	0.2	0.1	0.1	Labbro
1.3	2.8	1.6	-	2.1	5.6	3.9	0.8	0.6	0.2	Lingua
6.5	1.4	1.6	8.9	2.1	8.4	3.9	1.5	1.2	0.3	Bocca
1.3	1.4	-	-	6.2	2.8	3.9	0.7	0.5	0.2	Ghiandole salivari
-	-	3.2	-	-	-	-	0.3	0.3	0.1	Orofaringe
-	-	3.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	Rinofaringe
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Ipofaringe
1.3	-	1.6	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	Faringe NAS
1.3	-	3.2	1.8	-	2.8	15.6	0.7	0.4	0.2	Esofago
19.5	22.5	34.1	47.9	71.8	89.6	93.7	14.6	10.7	0.8	Stomaco
-	-	3.2	-	2.1	11.2	3.9	0.8	0.5	0.2	Intestino tenue
52.1	59.1	107.1	142	155.9	165.2	132.8	34.4	26.3	1.3	Colon
22.2	18.3	34.1	46.1	59.5	64.4	54.7	12.6	9.5	0.8	Retto
10.4	23.9	58.4	69.2	55.4	109.2	62.5	13.8	9.6	0.7	Fegato
9.1	18.3	34.1	42.6	45.1	42	54.7	9	6.5	0.6	Vie biliari
3.9	25.3	27.6	40.8	49.2	47.6	74.2	9.7	6.9	0.6	Pancreas
-	-	-	1.8	2.1	2.8	-	0.4	0.3	0.1	Cavità nasale
2.6	4.2	3.2	5.3	-	2.8	3.9	1	0.9	0.2	Laringe
36.5	33.8	66.5	49.7	53.3	67.2	39.1	17.2	14.4	1	Polmone
1.3	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.2	Altri organi toracici
-	-	1.6	3.5	2.1	-	-	0.7	0.6	0.2	Osso
3.9	19.7	17.9	21.3	18.5	14	19.5	8.6	7.5	0.7	Pelle, melanomi
53.4	92.8	157.4	211.2	246.2	288.5	351.5	56	41.5	1.6	^(a) Pelle, non melanomi
-	1.4	-	-	4.1	-	-	0.3	0.2	0.1	Mesotelioma
1.3	4.2	-	5.3	6.2	8.4	7.8	1.2	0.8	0.2	Sarcoma di Kaposi
1.3	-	4.9	1.8	2.1	2.8	3.9	1.3	1.2	0.3	Tessuti molli
186.3	218	240.2	252	201.1	204.5	214.8	104.2	91.2	2.5	Mammella
11.7	9.8	11.4	14.2	10.3	5.6	11.7	6.1	5.5	0.6	Utero, collo
63.8	70.3	56.8	69.2	67.7	50.4	7.8	20.2	17.5	1.1	Utero, corpo
-	2.8	6.5	5.3	4.1	14	23.4	2	1.4	0.3	Utero NAS
22.2	35.2	22.7	30.2	45.1	30.8	15.6	12.8	11.2	0.9	Ovaio
5.2	7	11.4	14.2	20.5	28	39.1	4.4	3.1	0.4	Altri genitali femminili
14.3	15.5	30.8	19.5	20.5	25.2	15.6	7.5	6.5	0.7	Rene
3.9	11.3	19.5	30.2	22.6	30.8	46.9	6.2	4.5	0.5	Vescica (maligni)
6.5	18.3	21.1	26.6	22.6	33.6	11.7	7	5.6	0.6	Vescica (non maligni)
1.3	-	4.9	-	8.2	8.4	7.8	1	0.7	0.2	Altre vie urinarie
1.3	-	1.6	1.8	4.1	2.8	-	0.7	0.5	0.2	Occhio
14.3	5.6	14.6	12.4	26.7	44.8	19.5	7.8	6.6	0.7	Encefalo e altro SNC (maligni)
20.8	25.3	34.1	40.8	43.1	25.2	35.1	13.2	11.5	0.9	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
32.6	19.7	9.7	10.6	10.3	14	-	18.1	17.5	1.1	Tiroide
1.3	1.4	4.9	5.3	2.1	5.6	7.8	2.8	2.7	0.4	Altre ghiandole endocrine
2.6	1.4	1.6	1.8	6.2	2.8	-	3.8	3.7	0.5	Linfoma di Hodgkin
32.6	38	26	49.7	45.1	53.2	27.3	15.3	12.9	0.9	Linfoma non Hodgkin
5.2	15.5	6.5	17.7	16.4	22.4	3.9	4	3.1	0.4	Mieloma
2.6	1.4	-	-	2.1	-	-	0.7	0.8	0.3	Leucemia linfatica acuta
3.9	5.6	6.5	-	10.3	8.4	-	1.5	1.2	0.3	Leucemia linfatica cronica
1.3	1.4	4.9	8.9	10.3	22.4	15.6	2.9	2.2	0.4	Leucemia mieloide acuta
2.6	4.2	3.2	3.5	2.1	5.6	-	1.1	0.9	0.2	Leucemia mieloide cronica
10.4	4.2	17.9	28.4	45.1	50.4	15.6	8.2	6.2	0.6	^(c) Altre MMPC e SMD
-	4.2	3.2	14.2	10.3	36.4	31.2	3.1	1.9	0.3	Leucemie NAS
-	1.4	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.2	Miscellanea
9.1	16.9	27.6	23.1	43.1	100.8	101.5	10.6	7	0.6	Mal definite e metastasi
685.4	863.7	1154	1378.8	1485.4	1764.5	1581.6	452.1	367.8	4.9	Totale
611.1	745.6	962.4	1126.8	1196.1	1450.8	1195	382.9	314.8	4.5	Totale escluso ^(a) (b)
600.7	741.3	944.6	1098.4	1151	1400.4	1179.4	374.7	308.6	4.5	Totale escluso ^(a) (b)(c)

**Tabella 3a - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010**

Mortalità. Distribuzione della frequenza assoluta dei decessi per tipo di tumore e fascia di età.
Età media e mediana al decesso.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Bocca	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
Ghiandole salivari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Rinofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Stomaco	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	9
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colon	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	8
Retto	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Pancreas	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	13
Cavità nasale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
Polmone	-	-	-	-	1	-	-	3	8	20	46
Altri organi toracici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Osso	-	-	2	1	1	-	-	1	-	2	-
Pelle, melanomi	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testicolo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Altri genitali maschili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
Vescica (non maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Occhio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Encefalo e altro SNC (maligni)	-	-	1	1	-	1	2	2	1	7	3
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
Tiroide	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Altre ghiandole endocrine	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linfoma non Hodgkin	-	-	2	-	-	-	-	1	3	3	6
Mieloma	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Leucemia linfatica acuta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Leucemia linfatica cronica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Leucemia mieloide acuta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Leucemia mieloide cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
^(c) Altre MMPC e SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Leucemie NAS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Miscellanea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal definite e metastasi	-	-	-	-	2	-	2	4	4	6	9
Totale	4	-	6	3	6	7	9	20	33	87	142
Totale escluso ^(a)(^b)	4	-	5	3	6	6	9	20	32	86	141
Totale escluso ^(a)(^b)(^c)	4	-	5	3	6	6	9	20	32	85	141

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale	Età media	Età mediana	Sede
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Labbro
1	2	1	-	-	1	1	10	65.5	63	Lingua
3	2	1	2	-	2	-	17	57.3	58	Bocca
-	4	2	2	1	3	3	18	69.4	68	Ghiandole salivari
2	1	1	1	-	-	-	8	60.9	58	Orofaringe
1	-	-	-	-	1	-	4	58	53	Rinofaringe
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Ipofaringe
2	-	1	-	1	-	1	7	67	68	Faringe NAS
4	5	3	6	6	5	1	34	66.6	68	Esofago
14	29	36	47	43	36	19	241	62.3	63	Stomaco
-	2	1	-	1	-	-	4	69.7	68	Intestino tenue
20	24	28	46	45	33	24	238	68.7	73	Colon
4	3	9	13	11	13	10	68	68.8	68	Retto
12	46	57	66	44	25	20	288	67	68	Fegato
2	5	12	4	7	7	8	50	71.2	73	Vie biliari
10	19	28	22	15	15	9	137	65.5	68	Pancreas
-	-	1	-	-	-	-	3	56.3	53	Cavità nasale
11	11	13	13	10	13	13	94	67.3	65.5	Laringe
84	151	198	212	186	145	51	1105	64.1	68	Polmone
3	-	3	-	6	-	2	15	71.8	73	Altri organi toracici
2	-	-	2	2	1	-	14	52.6	53	Osso
7	2	4	3	2	4	4	32	63	68	Pelle, melanomi
-	-	1	4	3	1	7	17	77.1	78	^(a) Pelle, non melanomi
-	4	2	2	4	-	2	14	73	73	Mesotelioma
-	-	-	-	1	2	1	4	83	83	Sarcoma di Kaposi
3	2	-	6	1	1	1	16	65.7	73	Tessuti molli
2	-	-	1	-	1	2	7	70	73	Mammella
-	1	-	1	1	1	-	5	69	73	Pene
1	16	21	37	53	97	72	297	73	73	Prostata
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	Testicolo
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Altri genitali maschili
4	5	11	11	10	11	2	61	61.2	63	Rene
9	21	20	42	33	37	35	203	65	65.5	Vescica (maligni)
1	-	4	2	6	3	5	22	71.6	73	Vescica (non maligni)
-	-	-	2	2	3	-	9	70.1	78	Altre vie urinarie
-	1	1	1	-	-	-	4	61.8	65.5	Occhio
6	10	12	10	3	6	3	68	57.8	63	Encefalo e altro SNC (maligni)
1	2	4	7	6	8	2	34	68.2	73	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
-	-	1	2	1	1	-	8	58.7	68	Tiroide
-	1	1	-	-	1	-	6	50	63	Altre ghiandole endocrine
-	1	-	1	-	1	1	4	76.8	78	Linfoma di Hodgkin
5	9	16	13	7	6	6	77	61.1	63	Linfoma non Hodgkin
3	3	5	4	13	5	2	36	69	70.5	Mieloma
-	-	1	-	-	1	-	5	59.2	58	Leucemia linfatica acuta
-	5	1	10	5	4	3	30	63.6	70.5	Leucemia linfatica cronica
2	3	3	7	7	3	-	29	55.3	58	Leucemia mieloide acuta
-	1	-	7	3	4	-	15	74.2	75.5	Leucemia mieloide cronica
-	1	6	3	6	9	12	38	75.8	78	^(c) Altre MMPC e SMD
2	4	8	5	8	6	4	38	70.7	73	Leucemie NAS
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Miscellanea
19	22	35	46	51	48	26	274	66	68	Mal definite e metastasi
240	418	552	663	604	565	352	3711	65.9	68	Totale
239	416	547	652	595	556	343	3660	65.6	68	Totale escluso ^(a) (b)
239	415	541	649	589	547	331	3622	65.3	68	Totale escluso ^(a) (b)(c)



Tabella 3b - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010

Mortalità. Distribuzione della frequenza assoluta dei decessi per tipo di tumore e fascia di età.
Età media e mediana al decesso.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bocca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ghiandole salivari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomaco	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colon	-	-	-	-	-	1	3	2	4	5	8
Retto	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Pancreas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6
Cavità nasale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polmone	-	-	-	-	-	1	3	3	4	9	15
Altri organi toracici	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Osso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pelle, melanomi	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-
Mammella	-	-	-	-	-	-	4	9	19	28	27
Utero, collo	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Utero, corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Utero NAS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
Ovaio	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8
Altri genitali femminili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Vescica (non maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Occhio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalo e altro SNC (maligni)	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	7
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
Tiroide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Altre ghiandole endocrine	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Linfoma non Hodgkin	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1
Mieloma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia linfatica acuta	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Leucemia linfatica cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Leucemia mieloide acuta	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2
Leucemia mieloide cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
^(c) Altre MMPC e SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Leucemie NAS	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Miscellanea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal definite e metastasi	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
Totale	2	-	1	2	1	8	19	32	45	84	106
Totale escluso ^{(a)(b)}	1	-	1	2	1	8	18	31	43	80	106
Totale escluso ^{(a)(b)(c)}	1	-	1	2	1	8	18	31	43	80	105

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale	Età media	Età mediana	Sede
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Labbro
-	-	-	1	1	3	-	5	78	78	Lingua
-	-	1	1	-	1	-	4	69.2	70.5	Bocca
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	Ghiandole salivari
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Orofaringe
1	-	-	-	-	-	-	3	53	53	Rinofaringe
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Ipofaringe
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Faringe NAS
-	-	1	1	-	1	4	7	78	78	Esofago
12	11	21	17	24	29	43	168	63.7	65.5	Stomaco
-	-	1	-	-	-	2	3	81.3	88	Intestino tenue
9	24	19	31	45	56	50	257	65.4	68	Colon
3	8	4	12	8	5	15	59	69.2	73	Retto
4	13	19	35	33	39	24	170	69.1	68	Fegato
7	8	14	12	15	10	12	83	69.7	68	Vie biliari
2	17	14	27	21	19	15	127	69	73	Pancreas
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Cavità nasale
2	2	-	1	1	2	1	9	73.6	75.5	Laringe
19	20	33	33	25	20	17	202	58	58	Polmone
1	-	1	-	-	-	-	4	53	55.5	Altri organi toracici
2	1	1	2	2	1	3	13	73.8	75.5	Osso
2	1	5	3	5	4	3	31	64.7	68	Pelle, melanomi
-	-	-	1	-	-	2	4	74.2	80.5	^(a) Pelle, non melanomi
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Mesotelioma
-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	Sarcoma di Kaposi
-	1	1	2	-	1	-	10	51.5	53	Tessuti molli
31	40	52	46	54	51	53	414	59.9	58	Mammella
1	1	-	1	1	3	-	10	61.8	60.5	Utero, collo
1	3	3	5	2	2	3	21	70	70.5	Utero, corpo
1	11	6	7	16	15	12	80	63	63	Utero NAS
6	9	10	15	11	9	3	77	63	63	Ovaio
1	1	4	8	9	4	6	33	75.3	73	Altri genitali femminili
3	4	6	2	2	8	5	31	69.9	70.5	Rene
1	4	9	7	10	5	11	50	69.9	70.5	Vescica (maligni)
-	-	-	-	-	3	4	7	-	-	Vescica (non maligni)
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Altre vie urinarie
-	-	1	2	2	-	-	5	74.2	75.5	Occhio
6	6	4	6	6	10	3	56	63.5	65.5	Encefalo e altro SNC (maligni)
2	1	5	5	12	8	3	44	63.7	68	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
-	2	1	2	1	1	2	11	72.3	73	Tiroide
1	-	1	1	1	1	1	7	68	73	Altre ghiandole endocrine
-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	Linfoma di Hodgkin
5	7	7	10	15	9	6	68	63.2	65.5	Linfoma non Hodgkin
2	1	4	6	6	8	5	32	73	73	Mieloma
1	-	1	1	1	1	-	8	60.5	63	Leucemia linfatica acuta
-	1	3	3	1	2	6	17	70.9	73	Leucemia linfatica cronica
2	1	3	4	4	6	4	30	60.9	65.5	Leucemia mieloide acuta
-	-	-	2	-	2	3	8	74.2	78	Leucemia mieloide cronica
-	-	6	1	10	7	10	35	77.3	78	^(c) Altre MMPC e SMD
2	2	2	2	7	8	9	34	69.7	73	Leucemie NAS
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Miscellanea
7	17	13	29	43	50	37	210	68.8	73	Mal definite e metastasi
138	217	278	344	396	405	381	2459	67.2	68	Totale
136	216	273	338	384	397	376	2411	67.3	68	Totale escluso ^(a) (b)
136	216	267	337	374	390	366	2376	67	68	Totale escluso ^(a) (b)(c)



Tabella 4a - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010

Mortalità. Tassi (x100.000) per tipo di decesso tumorale e fascia di età. Tasso grezzo (TG), Tasso standardizzato diretto (TSD, standard: pop. Europea). Errore standard (ES) del TSD.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.7
Bocca	-	-	-	-	-	-	1	1	0.9	1.1	3.7
Ghiandole salivari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2.4
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7
Rinofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	-
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	2.4
Stomaco	-	-	-	-	-	-	1	1	0.9	5.3	11
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colon	-	-	-	-	-	-	-	1	2.8	6.4	9.8
Retto	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	3.7
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	4.2	14.7
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2.4
Pancreas	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	4.2	15.9
Cavità nasale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.2
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	5.3	4.9
Polmone	-	-	-	-	1.1	-	-	2.9	7.6	21.2	56.2
Altri organi toracici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-
Osso	-	-	2.4	1.1	1.1	-	-	1	-	2.1	-
Pelle, melanomi	-	-	-	-	-	1.1	1	1	0.9	2.1	-
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	-	-	-	-	1.1	-	-	1	-	-	-
Mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-
Pene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-
Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testicolo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Altri genitali maschili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene	-	-	-	-	1.1	-	-	1	-	1.1	4.9
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2.1	3.7
Vescica (non maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-
Occhio	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Encefalo e altro SNC (maligni)	-	-	1.2	1.1	-	1.1	2	2	0.9	7.4	3.7
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	-	-	1.2	-	-	1.1	-	-	-	1.1	1.2
Tiroide	-	-	-	-	-	1.1	1	-	-	1.1	-
Altre ghiandole endocrine	2.6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linfoma non Hodgkin	-	-	2.4	-	-	-	-	1	2.8	3.2	7.3
Mieloma	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Leucemia linfatica acuta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2.1	-
Leucemia linfatica cronica	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Leucemia mieloide acuta	1.3	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	2.4
Leucemia mieloide cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
^(c) Altre MMPC e SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-
Leucemie NAS	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-
Miscellanea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal definite e metastasi	-	-	-	-	2.2	-	2	3.9	3.8	6.4	11
Totale	5.2	-	7.2	3.3	6.7	7.6	9.2	19.6	31.3	92.1	173.6
Totale escluso ^{(a)(b)}	5.2	-	6	3.3	6.7	6.5	9.2	19.6	30.3	91	172.4
Totale escluso ^{(a)(b)(c)}	5.2	-	6	3.3	6.7	6.5	9.2	19.6	30.3	90	172.4

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	ES (TSD)	Sede
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Labbro
1.4	3	1.8	-	-	4.9	9	0.8	0.8	0.2	Lingua
4.1	3	1.8	4.4	-	9.7	-	1.3	1.2	0.3	Bocca
-	5.9	3.7	4.4	2.9	14.6	26.9	1.4	1.3	0.3	Ghiandole salivari
2.7	1.5	1.8	2.2	-	-	-	0.6	0.6	0.2	Orofaringe
1.4	-	-	-	-	4.9	-	0.3	0.3	0.1	Rinofaringe
-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	Ipfaringe
2.7	-	1.8	-	2.9	-	9	0.5	0.5	0.2	Faringe NAS
5.4	7.4	5.5	13.2	17.4	24.3	9	2.6	2.3	0.4	Esofago
18.9	42.9	66.3	103.3	124.7	174.6	170.2	18.5	16.3	1.1	Stomaco
-	3	1.8	-	2.9	-	-	0.3	0.3	0.1	Intestino tenue
27	35.5	51.6	101.1	130.5	160.1	215	18.3	16.2	1.1	Colon
5.4	4.4	16.6	28.6	31.9	63.1	89.6	5.2	4.6	0.6	Retto
16.2	68	105	145	127.6	121.3	179.1	22.1	19.9	1.2	Fegato
2.7	7.4	22.1	8.8	20.3	34	71.7	3.8	3.5	0.5	Vie biliari
13.5	28.1	51.6	48.3	43.5	72.8	80.6	10.5	9.7	0.8	Pancreas
-	-	1.8	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	Cavità nasale
14.9	16.3	24	28.6	29	63.1	116.4	7.2	6.7	0.7	Laringe
113.6	223.1	364.9	465.8	539.3	703.4	456.8	84.9	75.2	2.3	Polmone
4.1	-	5.5	-	17.4	-	17.9	1.2	1.1	0.3	Altri organi toracici
2.7	-	-	4.4	5.8	4.9	-	1.1	1	0.3	Osso
9.5	3	7.4	6.6	5.8	19.4	35.8	2.5	2.3	0.4	Pelle, melanomi
-	-	1.8	8.8	8.7	4.9	62.7	1.3	1.3	0.3	^(a) Pelle, non melanomi
-	5.9	3.7	4.4	11.6	-	17.9	1.1	1	0.3	Mesotelioma
-	-	-	-	2.9	9.7	9	0.3	0.2	0.1	Sarcoma di Kaposi
4.1	3	-	13.2	2.9	4.9	9	1.2	1.1	0.3	Tessuti molli
2.7	-	-	2.2	-	4.9	17.9	0.5	0.5	0.2	Mammella
-	1.5	-	2.2	2.9	4.9	-	0.4	0.3	0.1	Pene
1.4	23.6	38.7	81.3	153.7	470.6	644.9	22.8	19.5	1.2	Prostata
-	-	-	-	-	4.9	-	0.2	0.1	0.1	Testicolo
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Altri genitali maschili
5.4	7.4	20.3	24.2	29	53.4	17.9	4.7	4.1	0.5	Rene
12.2	31	36.9	92.3	95.7	179.5	313.5	15.6	13.8	1	Vescica (maligni)
1.4	-	7.4	4.4	17.4	14.6	44.8	1.7	1.5	0.3	Vescica (non maligni)
-	-	-	4.4	5.8	14.6	-	0.7	0.5	0.2	Altre vie urinarie
-	1.5	1.8	2.2	-	-	-	0.3	0.3	0.1	Occhio
8.1	14.8	22.1	22	8.7	29.1	26.9	5.2	4.9	0.6	Encefalo e altro SNC (maligni)
1.4	3	7.4	15.4	17.4	38.8	17.9	2.6	2.2	0.4	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
-	-	1.8	4.4	2.9	4.9	-	0.6	0.5	0.2	Tiroide
-	1.5	1.8	-	-	4.9	-	0.5	0.5	0.2	Altre ghiandole endocrine
-	1.5	-	2.2	-	4.9	9	0.3	0.3	0.1	Linfoma di Hodgkin
6.8	13.3	29.5	28.6	20.3	29.1	53.7	5.9	5.5	0.6	Linfoma non Hodgkin
4.1	4.4	9.2	8.8	37.7	24.3	17.9	2.8	2.3	0.4	Mieloma
-	-	1.8	-	-	4.9	-	0.4	0.3	0.2	Leucemia linfatica acuta
-	7.4	1.8	22	14.5	19.4	26.9	2.3	2	0.4	Leucemia linfatica cronica
2.7	4.4	5.5	15.4	20.3	14.6	-	2.2	2	0.4	Leucemia mieloide acuta
-	1.5	-	15.4	8.7	19.4	-	1.2	0.9	0.2	Leucemia mieloide cronica
-	1.5	11.1	6.6	17.4	43.7	107.5	2.9	2.6	0.4	^(c) Altre MMPC e SMD
2.7	5.9	14.7	11	23.2	29.1	35.8	2.9	2.6	0.4	Leucemie NAS
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Miscellanea
25.7	32.5	64.5	101.1	147.9	232.9	232.9	21	18.4	1.1	Mal definite e metastasi
324.5	617.6	1017.3	1456.6	1751.4	2741	3152.7	285	253.7	4.2	Totale
323.1	614.7	1008.1	1432.4	1725.3	2697.3	3072.1	281.1	250.2	4.2	Totale escluso ^(a) (b)
323.1	613.2	997.1	1425.8	1707.9	2653.7	2964.6	278.1	247.5	4.2	Totale escluso ^(a) (b)(c)



Tabella 4b - Provincia di Caserta. Anni 2008-2010

Mortalità. Tassi (x100.000) per tipo di decesso tumorale e fascia di età. Tasso grezzo (TG), Tasso standardizzato diretto (TSD, standard: pop. Europea). Errore standard (ES) del TSD.

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
Labbro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bocca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Ghiandole salivari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.2
Ipfaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomaco	-	-	-	-	-	-	1	0.9	1.8	3	4.7
Intestino tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colon	-	-	-	-	-	1.1	2.9	1.9	3.7	5.1	9.4
Retto	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1	2.4
Fegato	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1	1.2
Vie biliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.5
Pancreas	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	5.1	7.1
Cavità nasale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polmone	-	-	-	-	-	1.1	2.9	2.8	3.7	9.1	17.6
Altri organi toracici	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1.2
Osso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pelle, melanomi	-	-	-	-	-	1.1	-	2.8	1.8	1	1.2
^(a) Pelle, non melanomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma di Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	-	-	-	1.1	1.1	1.1	-	-	1.8	-	-
Mammella	-	-	-	-	-	-	3.9	8.4	17.4	28.4	31.8
Utero, collo	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2.4
Utero, corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.2
Utero NAS	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	5.1	5.9
Ovaio	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.8	2	9.4
Altri genitali femminili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vescica (maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Vescica (non maligni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre vie urinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Occhio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalo e altro SNC (maligni)	-	-	-	-	-	1.1	1	2.8	0.9	2	8.2
^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	1.4	-	-	-	-	-	1	0.9	1.8	3	-
Tiroide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
Altre ghiandole endocrine	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-
Linfoma non Hodgkin	-	-	-	-	-	-	2	-	1.8	4.1	1.2
Mieloma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia linfatica acuta	-	-	-	-	-	-	1	0.9	-	-	1.2
Leucemia linfatica cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Leucemia mieloide acuta	-	-	1.3	-	-	-	-	0.9	-	2	2.4
Leucemia mieloide cronica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
^(c) Altre MMPC e SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
Leucemie NAS	-	-	-	1.1	-	-	-	-	0.9	-	-
Miscellanea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal definite e metastasi	1.4	-	-	-	-	-	1	1.9	1.8	3	5.9
Totale	2.8	-	1.3	2.3	1.1	8.6	18.7	30	41.2	85.2	124.7
Totale escluso ^{(a)(b)}	1.4	-	1.3	2.3	1.1	8.6	17.7	29	39.4	81.1	124.7
Totale escluso ^{(a)(b)(c)}	1.4	-	1.3	2.3	1.1	8.6	17.7	29	39.4	81.1	123.5

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	ES (TSD)	Sede
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Labbro
-	-	-	1.8	2.1	8.4	-	0.4	0.2	0.1	Lingua
-	-	1.6	1.8	-	2.8	-	0.3	0.2	0.1	Bocca
-	-	1.6	-	-	-	3.9	0.1	0.1	0.1	Ghiandole salivari
-	-	-	-	-	-	3.9	0.1	0	0	Orofaringe
1.3	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	Rinofaringe
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Ipfaringe
-	-	1.6	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	Faringe NAS
-	-	1.6	1.8	-	2.8	15.6	0.5	0.3	0.1	Esofago
15.6	15.5	34.1	30.2	49.2	81.2	167.9	12.2	8.3	0.7	Stomaco
-	-	1.6	-	-	-	7.8	0.2	0.1	0.1	Intestino tenue
11.7	33.8	30.8	55	92.3	156.8	195.3	18.7	12.3	0.8	Colon
3.9	11.3	6.5	21.3	16.4	14	58.6	4.3	3.1	0.4	Retto
5.2	18.3	30.8	62.1	67.7	109.2	93.7	12.4	7.9	0.6	Fegato
9.1	11.3	22.7	21.3	30.8	28	46.9	6	4.4	0.5	Vie biliari
2.6	23.9	22.7	47.9	43.1	53.2	58.6	9.3	6.6	0.6	Pancreas
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Cavità nasale
2.6	2.8	-	1.8	2.1	5.6	3.9	0.7	0.5	0.2	Laringe
24.8	28.1	53.6	58.6	51.3	56	66.4	14.7	11.6	0.9	Polmone
1.3	-	1.6	-	-	-	-	0.3	0.3	0.1	Altri organi toracici
2.6	1.4	1.6	3.5	4.1	2.8	11.7	0.9	0.7	0.2	Osso
2.6	1.4	8.1	5.3	10.3	11.2	11.7	2.3	1.7	0.3	Pelle, melanomi
-	-	-	1.8	-	-	7.8	0.3	0.2	0.1	^(a) Pelle, non melanomi
1.3	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	Mesotelioma
-	-	-	-	-	2.8	7.8	0.2	0.1	0.1	Sarcoma di Kaposi
-	1.4	1.6	3.5	-	2.8	-	0.7	0.6	0.2	Tessuti molli
40.4	56.3	84.4	81.6	110.8	142.8	207	30.2	23.1	1.2	Mammella
1.3	1.4	-	1.8	2.1	8.4	-	0.7	0.6	0.2	Utero, collo
1.3	4.2	4.9	8.9	4.1	5.6	11.7	1.5	1.2	0.3	Utero, corpo
1.3	15.5	9.7	12.4	32.8	42	46.9	5.8	4.1	0.5	Utero NAS
7.8	12.7	16.2	26.6	22.6	25.2	11.7	5.6	4.4	0.5	Ovaio
1.3	1.4	6.5	14.2	18.5	11.2	23.4	2.4	1.5	0.3	Altri genitali femminili
3.9	5.6	9.7	3.5	4.1	22.4	19.5	2.3	1.6	0.3	Rene
1.3	5.6	14.6	12.4	20.5	14	43	3.6	2.5	0.4	Vescica (maligni)
-	-	-	-	-	8.4	15.6	0.5	0.2	0.1	Vescica (non maligni)
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Altre vie urinarie
-	-	1.6	3.5	4.1	-	-	0.4	0.3	0.1	Occhio
7.8	8.4	6.5	10.6	12.3	28	11.7	4.1	3.2	0.5	Encefalo e altro SNC (maligni)
2.6	1.4	8.1	8.9	24.6	22.4	11.7	3.2	2.2	0.4	^(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)
-	2.8	1.6	3.5	2.1	2.8	7.8	0.8	0.6	0.2	Tiroide
1.3	-	1.6	1.8	2.1	2.8	3.9	0.5	0.4	0.2	Altre ghiandole endocrine
-	-	-	-	4.1	-	-	0.3	0.2	0.1	Linfoma di Hodgkin
6.5	9.8	11.4	17.7	30.8	25.2	23.4	5	3.6	0.5	Linfoma non Hodgkin
2.6	1.4	6.5	10.6	12.3	22.4	19.5	2.3	1.5	0.3	Mieloma
1.3	-	1.6	1.8	2.1	2.8	-	0.6	0.5	0.2	Leucemia linfatica acuta
-	1.4	4.9	5.3	2.1	5.6	23.4	1.2	0.8	0.2	Leucemia linfatica cronica
2.6	1.4	4.9	7.1	8.2	16.8	15.6	2.2	1.6	0.3	Leucemia mieloide acuta
-	-	-	3.5	-	5.6	11.7	0.6	0.4	0.1	Leucemia mieloide cronica
-	-	9.7	1.8	20.5	19.6	39.1	2.6	1.5	0.3	^(c) Altre MMPC e SMD
2.6	2.8	3.2	3.5	14.4	22.4	35.1	2.5	1.5	0.3	Leucemie NAS
-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Miscellanea
9.1	23.9	21.1	51.5	88.2	140	144.5	15.3	9.8	0.7	Mal definite e metastasi
179.8	305.3	451.2	610.4	812.5	1134.3	1487.9	179.2	127	2.7	Totale
177.2	303.8	443.1	599.8	787.9	1111.9	1468.3	175.7	124.6	2.7	Totale escluso ^(a) (b)
177.2	303.8	433.3	598	767.3	1092.3	1429.3	173.1	123.1	2.7	Totale escluso ^(a) (b)(c)